

Meccanica quantistica, equazioni d'onda e diagrammi di Feynman

(Appunti per il corso di Fisica Nucleare e Subnucleare 2013/14)

Fiorenzo Bastianelli

In queste note introduciamo equazioni d'onda libere associate alla propagazione di particelle quantistiche, le interazioni descritte dai termini non-lineari nelle equazioni d'onda, ed infine la visualizzazione dei processi d'interazioni per mezzo dei diagrammi di Feynman.

1 Equazione di Schrödinger

Dopo l'introduzione del quanto d'azione h da parte di Planck (1900) e l'uso che ne fece Einstein (1905) nello spiegare l'effetto fotoelettrico (fotoni come quanti d'onda elettromagnetica con energia $E = h\nu$), e dopo Bohr (1913) con il suo modello atomico con livelli di energia quantizzati, rimaneva ancora da capire quali leggi fondamentali potessero organizzare quanto andava emergendo nel mondo subatomico, cioè quali fossero le vere leggi della meccanica quantistica. Un contributo importante venne da de Broglie, che nel 1923 suggerì un'estensione dell'idea di Einstein, congetturando un comportamento ondulatorio per le particelle di materia, assegnando una lunghezza d'onda $\lambda = \frac{h}{p}$ a particelle con momento p . Questa visione rese interpretabile l'assunzione di Bohr di livelli energetici atomici quantizzati come i soli possibili per l'elettrone, perché corrispondono a traiettorie contenenti un numero intero di lunghezze d'onda dell'elettrone, quindi stabili per interferenza costruttiva. De Broglie si ispirò per questa sua idea alla meccanica relativistica: un campo d'onda con frequenza $\nu = \frac{1}{T}$ (dove T è il periodo) e con numero d'onda \vec{k} (dove $|\vec{k}| = \frac{1}{\lambda}$, con λ la lunghezza d'onda) ha la forma

$$\psi(\vec{x}, t) \sim e^{2\pi i(\vec{k}\cdot\vec{x}-\nu t)} \quad (e^{i\alpha} = \cos \alpha + i \sin \alpha) . \quad (1)$$

Assumendo che la fase $2\pi(\vec{k}\cdot\vec{x} - \nu t)$ fosse un invariante di Lorentz, e sapendo che le coordinate spazio-temporali (t, \vec{x}) formano un quadrivettore, de Broglie dedusse che anche (ν, \vec{k}) doveva essere un quadrivettore, e quindi trasformarsi per cambio di sistema di riferimento inerziale come i quadrivettori (t, \vec{x}) e (E, \vec{p}) . Poiché nel caso dei fotoni valeva $E = h\nu$, gli risultò naturale estendere la proporzionalità ai quadrivettori (ν, \vec{k}) e (E, \vec{p}) , anche alle particelle materiali con massa non nulla, e con la stessa costante di proporzionalità h valida per i fotoni

$$(E, \vec{p}) = h(\nu, \vec{k}) \quad \rightarrow \quad \vec{p} = h\vec{k}, \quad E = h\nu . \quad (2)$$

Questa relazione porta ad associare una lunghezza d'onda $\lambda = \frac{h}{|\vec{p}|}$ alle particelle di materia con momento \vec{p} . Quindi l'onda associata a particelle materiali con momento \vec{p} ed energia E assume la forma

$$\psi(\vec{x}, t) \sim e^{2\pi i(\vec{k}\cdot\vec{x}-\nu t)} = e^{\frac{2\pi i}{h}(\vec{p}\cdot\vec{x}-Et)} = e^{\frac{i}{h}(\vec{p}\cdot\vec{x}-Et)} . \quad (3)$$

Questa fu la proposta di de Broglie.

A questo punto Schrödinger si chiese: che tipo di equazione soddisfa tale funzione? Iniziò direttamente con il caso relativistico, ma siccome non gli fu possibile riprodurre alcuni risultati

sperimentali per l'atomo d'idrogeno, si accontentò del limite non-relativistico che sembrava funzionare meglio (infatti oggi sappiamo che alcune correzioni relativistiche sono parzialmente compensate da effetti dovuti allo spin dell'elettrone, di cui non si teneva conto). Per una particella libera non-relativistica vale

$$E = \frac{\vec{p}^2}{2m}$$

ed è immediato verificare che la funzione d'onda (3) soddisfa

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\vec{x}, t) = E\psi(\vec{x}, t) = \frac{\vec{p}^2}{2m} \psi(\vec{x}, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi(\vec{x}, t)$$

e quindi

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\vec{x}, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi(\vec{x}, t). \quad (4)$$

Questa è l'equazione soddisfatta dalla funzione d'onda di de Broglie.

In questo modo Schrödinger identificò l'equazione fondamentale della meccanica quantistica, detta appunto equazione di Schrödinger. Seppur dedotta per una particella non-relativistica puntiforme e libera, scritta nella forma

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi = H\psi \quad (5)$$

dove H è l'operatore hamiltoniano l'equazione di Schrödinger è congetturata avere una validità universale per la descrizione di sistemi quantistici.

Dunque il trucco per ottenere una equazione d'onda dal modello classico di particella puntiforme è questo:

- considerare la relazione classica tra energia ed impulso $E = \frac{\vec{p}^2}{2m}$
- sostituire $E \rightarrow i\hbar \frac{\partial}{\partial t}$ e $\vec{p} \rightarrow -i\hbar \vec{\nabla}$
- interpretare questi operatori differenziali come agenti su una funzione d'onda ψ :

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\vec{x}, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi(\vec{x}, t).$$

Naturalmente Schrödinger estese queste sue considerazioni ad una particella carica (l'elettrone) immersa nel campo coulombiano di un nucleo, per riprodurre il modello atomico di Bohr e calcolarne analiticamente varie proprietà, che confrontò con le misure sperimentali ottenendo un notevole successo.

Principio di indeterminazione.

Dall'analogia con le onde luminose, dove l'intensità è proporzionale al modulo quadro dell'ampiezza, si intuì presto che la densità di probabilità $p(\vec{x}, t)$ di trovare la particella in un punto \vec{x} al tempo t doveva essere collegata al modulo quadro della funzione d'onda $|\psi(\vec{x}, t)|^2$. In particolare, la funzione d'onda deve essere normalizzata opportunamente ($\int d^3x |\psi(\vec{x}, t)|^2 = 1$).

Un'onda perfettamente sinusoidale come $\psi(\vec{x}, t) = e^{\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\cdot\vec{x} - Et)}$ è estesa su tutto lo spazio tempo ($|\psi(\vec{x}, t)|^2 = 1$) e non è normalizzabile ($\int d^3x |\psi(\vec{x}, t)|^2 = \infty$): infatti per tale onda il momento è noto esattamente ad ogni istante di tempo (vale \vec{p}), ma non lo è la posizione della particella, che infatti potrebbe trovarsi ovunque nello spazio. Per localizzare la particella si

possono sommare varie frequenze, o meglio vari numeri d'onda \vec{k} . In termini del momento \vec{p} questo si traduce in un integrale della forma

$$\psi(\vec{x}, t) \sim \sum_{\vec{p}} \phi(\vec{p}) e^{\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\cdot\vec{x}-Et)} \sim \int d^3p \phi(\vec{p}) e^{\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\cdot\vec{x}-Et)} \quad (6)$$

dove $\phi(\vec{p})$ indica i coefficienti di Fourier dell'onda piana con momento \vec{p} . Scegliendo opportunamente i coefficienti di Fourier è ora possibile normalizzare la funzione d'onda correttamente. Come conseguenza matematica della trasformata di Fourier si può dedurre che l'incertezza sulla posizione $\Delta\vec{x}$, codificata in $|\psi(\vec{x}, t)|^2$, moltiplicata per l'incertezza sul valore del momento $\Delta\vec{p}$, codificata in $|\phi(\vec{p})|^2$, deve essere necessariamente maggiore di una quantità minima proporzionale ad \hbar :

$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}, \quad \Delta y \Delta p_y \geq \frac{\hbar}{2}, \quad \text{etc.} \quad (7)$$

Queste disuguaglianze sono note come "principio d'indeterminazione". Strettamente collegate al principio di indeterminazione sono le regole di commutazione che emergono tra le variabili dinamiche: ad esempio se $p_x = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x}$ è da considerarsi come un operatore differenziale, si ha

$$[x, p_x] = i\hbar \quad (8)$$

etc. per le altre coordinate.

Conservazione della probabilità.

Se una particella non-relativistica è descritta dalla funzione d'onda normalizzabile $\psi(\vec{x}, t)$ (N.B. l'onda piana non è normalizzabile, per cui occorre considerare pacchetti d'onda, come descritto sopra), allora si può interpretare la grandezza $\rho(\vec{x}, t) = |\psi(\vec{x}, t)|^2$ come densità di probabilità di trovare la particella nel punto \vec{x} al tempo t . In particolare, si può provare che ρ soddisfa una equazione di continuità

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{J} = 0 \quad (9)$$

con una opportuna corrente \vec{J} . Questo equivale alla conservazione della probabilità di trovare la particella da qualche parte ad ogni istante di tempo. In particolare la particella non-relativistica non può essere creata né distrutta. Questo è comprensibile pensando al limite non-relativistico di una particella relativistica, limite formalmente ottenuto mandando $c \rightarrow \infty$ (velocità limite di propagazione delle interazioni molto grande, tendente all'infinito come limite matematico): infatti dalla formula relativistica dell'energia

$$E = \sqrt{\vec{p}^2 c^2 + m^2 c^4} = mc^2 \sqrt{1 + \frac{\vec{p}^2}{m^2 c^2}} \implies mc^2 + \frac{\vec{p}^2}{2m^2} + \dots \quad (10)$$

da cui si vede che per $c \rightarrow \infty$ occorrerebbe un'energia infinita per creare una particella di massa m . Poiché la velocità della luce c è finita, è possibile che interazioni relativistiche permettano la creazione e la distruzione di particelle.

2 Equazioni d'onda relativistiche

2.1 Equazione di Klein-Gordon

Come ottenere una equazione d'onda relativistica? Un'idea semplice è quella di usare la corretta relazione relativistica tra energia ed impulso. Infatti sappiamo che

$$p_\mu p^\mu = -m^2 c^2 \quad \Longrightarrow \quad -\frac{E^2}{c^2} + \vec{p}^2 = -m^2 c^2 \quad \Longrightarrow \quad E^2 = \vec{p}^2 c^2 + m^2 c^4. \quad (11)$$

Quindi si potrebbe usare $E = \sqrt{\vec{p}^2 c^2 + m^2 c^4}$, ma l'equazione che emerge con le sostituzioni $E \rightarrow i\hbar \frac{\partial}{\partial t}$ e $\vec{p} \rightarrow -i\hbar \vec{\nabla}$ produce un'equazione complicatissima di difficile interpretazione, contenente una radice quadrata di operatori differenziali

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \phi(\vec{x}, t) = \sqrt{-\hbar^2 c^2 \nabla^2 + m^2 c^4} \phi(\vec{x}, t). \quad (12)$$

Klein e Gordon proposero una equazione più semplice considerando la relazione quadratica tra energia ed impulso, che ha il pregio di non contenere nessuna radice quadrata. Partendo da $E^2 = \vec{p}^2 c^2 + m^2 c^4$, ed usando $E \rightarrow i\hbar \frac{\partial}{\partial t}$ e $\vec{p} \rightarrow -i\hbar \vec{\nabla}$, ottennero l'equazione

$$\left(-\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} + \nabla^2 - \frac{m^2 c^2}{\hbar^2} \right) \phi(\vec{x}, t) = 0 \quad (13)$$

conosciuta oggi come equazione di Klein-Gordon. In notazioni relativistiche si può scrivere come

$$(\partial_\mu \partial^\mu - \mu^2) \phi(x) = 0, \quad \mu \equiv \frac{mc}{\hbar}. \quad \partial_\mu \equiv \frac{\partial}{\partial x^\mu} \quad (14)$$

ed anche come

$$(\square - \mu^2) \phi(x) = 0 \quad (15)$$

dove $\square \equiv \partial_\mu \partial^\mu = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} + \nabla^2$ indica l'operatore di d'Alembert (il d'alembertiano). Secondo Dirac, Schrödinger considerò questa equazione ancor prima di dedurre la sua equazione, ma insoddisfatto dei risultati che sembrava produrre per l'atomo d'idrogeno, si accontentò del suo limite non relativistico. Quando più tardi si decise a pubblicarla, era già stato preceduto da Klein e Gordon.

Soluzioni dell'eq. di Klein-Gordon. Naturalmente, ovvie soluzioni dell'equazione di Klein-Gordon sono le soluzioni di onda piana

$$\phi(x) = e^{\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\cdot\vec{x} - Et)}, \quad \text{con } E = \sqrt{\vec{p}^2 c^2 + m^2 c^4}, \quad (16)$$

che possono essere collegate a particelle scalari (cioè con spin $s = 0$) di massa m . Ma esiste anche un'altra classe di soluzioni, quelle con energie negative $E = -\sqrt{\vec{p}^2 c^2 + m^2 c^4}$. Come interpretarle fisicamente? Queste segnalano l'esistenza di "antiparticelle", particelle con stessa massa e spin, ma con tutte le altre possibili cariche interne, come la carica elettrica, di segno opposto. Questa interpretazione, originariamente proposta da Dirac per le soluzioni della sua equazione (l'equazione di Dirac che descrive particelle relativistiche di massa m e spin $s = \frac{1}{2}$), è necessaria per tutte le equazioni d'onda relativistiche, ed è giustificabile rigorosamente all'interno della teoria quantistica dei campi (conosciuta anche come "seconda quantizzazione": in tale formalismo le equazioni d'onda come quella sopra descritta, sono dapprima considerate come

equazioni di campo classiche e poi quantizzate opportunamente; in tale modo il campo d'onda quantizzato permette di descrivere un numero arbitrario di particelle identiche e corrispondenti antiparticelle, e trattare processi in cui il numero di particelle totali varia a causa di processi di creazione o annichilazione di particelle).

Una soluzione generale del campo di Klein-Gordon libero può essere visto come una combinazione lineare (nel senso di Fourier) di soluzioni di onda piana con energie sia positive che negative. Ad esempio, se il campo di Klein Gordon è considerato reale (campo scarico), la soluzione generale assume la forma (in unità dove vale $\hbar = c = 1$)

$$\phi(x) \sim \sum_{\vec{p}} \left(a(\vec{p}) e^{-iE_p t + i\vec{p}\cdot\vec{x}} + a^*(\vec{p}) e^{iE_p t - i\vec{p}\cdot\vec{x}} \right), \quad E_p \equiv \sqrt{\vec{p}^2 + m^2} > 0 \quad (17)$$

dove i coefficienti di Fourier $a(\vec{p})$ ed $a^*(\vec{p})$ sono associati (nell'interpretazione della teoria dei campi quantistici) alla distruzione ed alla creazione di particelle. In tal caso particelle ed antiparticelle coincidono, non ci sono cariche come la carica elettrica che possano differenziarle. Nel caso di un campo di Klein-Gordon complesso (campo carico), la soluzione generale assume la forma

$$\begin{aligned} \phi(x) &= \sum_{\vec{p}} \left(a(\vec{p}) e^{-iE_p t + i\vec{p}\cdot\vec{x}} + b^*(\vec{p}) e^{iE_p t - i\vec{p}\cdot\vec{x}} \right) \\ \phi^*(x) &= \sum_{\vec{p}} \left(b(\vec{p}) e^{-iE_p t + i\vec{p}\cdot\vec{x}} + a^*(\vec{p}) e^{iE_p t - i\vec{p}\cdot\vec{x}} \right) \end{aligned} \quad (18)$$

dove ora i coefficienti di Fourier $a(\vec{p})$ ed $a^*(\vec{p})$ sono associati alla distruzione ed alla creazione di particelle, mentre i coefficienti di Fourier $b(\vec{p})$ ed $b^*(\vec{p})$ alla distruzione ed alla creazione di antiparticelle (sempre in una interpretazione di seconda quantizzazione).

Potenziale di Yukawa. Consideriamo l'equazione con sorgente esterna

$$(\square - \mu^2)\phi(x) = J(x) \quad (19)$$

con $J(x) = g\delta^{(3)}(\vec{x})$ che descrive una sorgente statica puntiforme localizzata nell'origine delle coordinate spaziali (con $\delta^{(3)}(\vec{x})$ si indica la funzione delta di Dirac). Se consideriamo una soluzione statica, indipendente dal tempo, allora l'equazione si semplifica e diventa

$$(\nabla^2 - \mu^2)\phi(\vec{x}) = g\delta^{(3)}(\vec{x}) \quad (20)$$

Per $\mu = 0$ riconosciamo l'equazione di Poisson dell'elettrostatica, con soluzione il potenziale coulombiano

$$\phi(\vec{x}) = -\frac{g}{4\pi} \frac{1}{r}. \quad (21)$$

Per $\mu \neq 0$ la soluzione può essere calcolata usando la trasformata di Fourier che genera il potenziale di Yukawa

$$\phi(\vec{x}) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{(-g)}{p^2 + \mu^2} e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}} = -\frac{g}{4\pi} \frac{e^{-\mu r}}{r}. \quad (22)$$

Anche se non si conoscono le tecniche della trasformata di Fourier è possibile verificare che queste soluzioni soddisfano le rispettive equazioni per $r \neq 0$, basta usare il laplaciano scritto in coordinate sferiche ($\nabla^2 = \frac{1}{r^2}\partial_r r^2 \partial_r + \text{derivate sugli angoli}$). Inoltre il comportamento singolare ad $r = 0$ è collegato all'intensità della carica puntiforme, come note nel caso coulombiano.

Azione libera e propagatore. L'equazione di Klein-Gordon può essere derivata da un semplice principio d'azione. Per un campo scalare reale $\phi^* = \phi$, l'azione è data da

$$S[\phi] = \int d^4x \left(-\frac{1}{2} \partial^\mu \phi \partial_\mu \phi - \frac{\mu^2}{2} \phi^2 \right) \quad (23)$$

e richiedendo la condizione di minimo $\delta S = 0$ sotto variazioni $\delta\phi(x)$ si ottiene l'equazione di Klein-Gordon (come equazione di Eulero-Lagrange)

$$(\square - \mu^2)\phi(x) = 0 . \quad (24)$$

Equazioni del moto libere e relativa azione descrivono la propagazione libera del campo d'onda o, equivalentemente, delle particelle associate, i quanti del campo.

Nella teoria quantistica è utile considerare il “propagatore libero”, che essenzialmente corrisponde alla funzione di Green $G(x, y)$ associata all'equazione di Klein-Gordon, e descrive matematicamente la propagazione di una particella dal punto dello spazio-tempo x al punto dello spazio-tempo y , o viceversa, ed indicato graficamente dal diagramma di Feynman

$$x \text{ ————— } y$$

La funzione di Green ell'equazione di Klein-Gordon corrisponde alla soluzione dell'equazione di Klein-Gordon in presenza di una sorgente puntiforme istantanea di intensità unitaria. In formule

$$(-\square_x + \mu^2)G(x, y) = \delta^4(x - y) . \quad (25)$$

In trasformata di Fourier la soluzione si scrive come

$$G(x, y) = \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} \frac{e^{ip_\mu(x^\mu - y^\mu)}}{p^2 + \mu^2 - i\epsilon} \quad (26)$$

dove $\epsilon \rightarrow 0^+$ è un parametro infinitesimo positivo che implementa opportune condizioni al contorno (prescrizione causale di Feynman). In una interpretazione particellare descrive sia la propagazione di “particelle reali” che gli effetti di “particelle virtuali”. Il propagatore è spesso descritto con la sua trasformata di Fourier, $\frac{1}{p^2 + \mu^2}$, ed indicato con il seguente diagramma di Feynman

$$\text{—————}$$

$$p$$

dove p indica il quadrimomento trasportato della particella che scorre lungo la linea.

2.2 Altre equazioni d'onda

L'equazione di Klein-Gordon è un'equazione relativistica che descrive particelle scalari, cioè con spin $s = 0$, ma poiché tiene conto della corretta relazione relativistica tra energia ed impulso contiene già l'essenza di tutte le equazioni relativistiche (come l'apparente presenza di soluzioni con energie negative, da reinterpretare come antiparticelle con energia positiva). Le equazioni d'onda corrette per descrivere particelle con spin s dipende dal valore dello spin e sono conosciute come segue:

- spin 0 \rightarrow equazione di Klein-Gordon
- spin $\frac{1}{2}$ \rightarrow equazione di Dirac
- spin 1 senza massa \rightarrow equazioni (libere) di Maxwell
- spin 1 massiva \rightarrow equazioni di Proca
- spin $\frac{3}{2}$ \rightarrow equazione di Rarita-Schwinger
- spin 2 \rightarrow equazioni di Pauli-Fierz (equazioni di Einstein linearizzate).

In generale particelle relativistiche sono classificate da massa m e spin s , dove il valore dello spin indica che ci sono in generale $2s + 1$ componenti fisiche indipendenti della funzione d'onda, a meno che $m = 0$, nel qual caso esistono solo due componenti fisiche (collegate all'elicità, definita come proiezione dello spin lungo la direzione del moto).

3 Interazioni e diagrammi di Feynman

Le azioni libere dei campi d'onda associati alle varie particelle (il campo dell'elettrone ψ descrive tutti gli elettroni ed i positroni, il campo del potenziale elettromagnetico A_μ descrive tutti i fotoni, etc.) generano le equazioni d'onda libere e descrivono la propagazione dei rispettivi quanti. Le interazioni possono essere introdotte aggiungendo dei potenziali d'interazione all'azione, che così producono termini non lineari nelle equazioni d'onda. Questi potenziali contengono i vertici elementari delle varie interazioni. A tali vertici sono associate costanti d'accoppiamento che parametrizzano l'intensità della interazione.

3.1 Esempi illustrativi

Consideriamo a scopo illustrativo alcuni semplici modelli teorici con particelle scalari. La propagazione libera di particelle scalari scariche (in tal caso particelle e antiparticelle coincidono) è descritta dal propagatore

$$\overline{\hspace{1.5cm}} \\ \phi$$

che è collegato all'equazione di Klein-Gordon lineare $(-\square + \mu^2)\phi(x) = 0$, o equivalentemente alla corrispondente lagrangiana in (23), quadratica nei campi d'onda di Klein-Gordon


$$\mathcal{L}_0 = -\frac{1}{2}\partial^\mu\phi\partial_\mu\phi - \frac{\mu^2}{2}\phi^2 \tag{27}$$

Quello che qui ci interessa sottolineare è solo il fatto che la propagazione libera è descritta da termini quadratici nella lagrangiana.

Le interazioni emergono come termini di ordine superiore nella lagrangiana, termini che producono modifiche non-lineari alle equazioni d'onda. Ad esempio un termine cubico nel potenziale d'interazione, che compare nella lagrangiana come

$$\mathcal{L}_{int} = -\mathcal{V}_{int} = -\lambda\phi^3 \quad (28)$$

produce termini non-lineari nell'equazione del moto del campo d'onda. Tenendo conto del duplice ruolo di un campo nel descrivere la creazione o la distruzione di particelle, possiamo visualizzare graficamente questo potenziale con il seguente diagramma di Feynman



La costante d'accoppiamento λ , se sufficientemente piccola, può essere trattata perturbativamente. Siccome il campo d'onda può descrivere sia la creazione che la distruzione di particelle, una particella uscente dal vertice può essere scambiata con una particella entrante, o viceversa.

Ampiezze di scattering possono essere ottenute collegando stati iniziali agli stati finali di un determinato processo di diffusione usando *propagatori* e *vertici* in tutti i modi possibili. Ad esempio, lo scattering di due particelle (i quanti del campo ϕ) in due particelle è descritto da un'ampiezza di probabilità che può essere visualizzata dai seguenti grafici di Feynman

$$\begin{aligned}
 A &\sim \text{diagramma 1} + \text{diagramma 2} + \text{diagramma 3} + \dots \\
 &= a_2\lambda^2 + \dots
 \end{aligned} \quad (29)$$

ed a cui è associata una probabilità

$$P \sim |A|^2 = p_4\lambda^4 + \dots \quad (30)$$

dove i puntini indicano termini successivi di ordine superiore nella costante d'accoppiamento λ .

Consideriamo brevemente anche il caso del campo di Klein-Gordon complesso, i cui quanti corrispondono a particelle ed antiparticelle. Il propagatore è ora indicato da una linea orientata



che naturalmente descrive anche la propagazione (avanti nel tempo) di antiparticelle




Questa propagazione libera corrisponde alle equazioni d'onda lineari, ottenibili dalla lagrangiana quadratica

$$\mathcal{L}_0 = -\partial^\mu \phi^* \partial_\mu \phi - \mu^2 \phi^* \phi. \quad (31)$$

Una possibile interazione (che conserva la carica interna $U(1)$ associata a queste particelle scalari) è definita dal seguente termine d'interazioni quartico

$$\mathcal{L}_{int} = -\mathcal{V}_{int} = -g \phi^* \phi^* \phi \phi \quad (32)$$

con costante d'accoppiamento g . Questo potenziale identifica un vertice d'interazione elementare che può essere visualizzato con



che per convenzione descrive anche tutte le possibilità alternative, ottenute sostituendo particelle (antiparticelle) entranti con antiparticelle (particelle) uscenti o viceversa.

3.2 Esempio della QED


Ad esempio, la propagazione e l'interazione tra fotoni ed elettroni (QED) è descritta dalla (densità di) lagrangiana \mathcal{L}_{QED} (e dall'azione collegata $S_{QED} = \int d^4x \mathcal{L}_{QED}$)

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{QED} &= -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - \bar{\psi}(\gamma^\mu \partial_\mu + m)\psi - ieA_\mu \bar{\psi} \gamma^\mu \psi \\ &= \text{diagramma } \gamma + \text{diagramma } e^- + \text{diagramma } e^- \gamma \end{aligned} \quad (33)$$

Il primo termine descrive la propagazione libera del campo A_μ (cioè dei fotoni), il secondo termine la propagazione libera del campo ψ (cioè degli elettroni e relative antiparticelle), il terzo termine descrive l'interazione elementare tra fotoni ed elettroni. La costante e qui introdotta rappresenta la costante d'accoppiamento, ed è identificata con il valore assoluto dell'intensità della carica elementare dell'elettrone. Spesso si parameterizza l'intensità di questa interazione con $\sqrt{\alpha}$, dove $\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} \approx \frac{1}{137}$ è la costante di struttura fine, numero adimensionale indipendente dalle unità di misura scelte (in unità di Heaviside-Lorentz la costante ϵ_0 è incorporata nelle unità di misura per cui si ha $\alpha = \frac{e^2}{4\pi\hbar c}$; combinando infine queste unità con quelle naturali si può scrivere $\alpha = \frac{e^2}{4\pi}$: queste ultime sono le unità con cui è stata riportata qui sopra la


lagrangiana della QED). Dunque il numero puro $\sqrt{\alpha} \propto e$ indica la costante d'accoppiamento della QED.

Quando la costante d'accoppiamento $\sqrt{\alpha} \propto e$ può essere trattata perturbativamente, si possono calcolare le ampiezze dei vari processi fisici descritti dalla QED in termini delle ampiezze parziali corrispondenti ai vari diagrammi di Feynman costruiti utilizzando propagatori ed il vertice elementare che compare nella lagrangiana (33). Ad esempio, lo scattering elettrone-elettrone (Möller scattering) all'ordine più basso è dato da (il tempo scorre lungo l'asse orizzontale)




Ad ogni vertice è associata la costante d'accoppiamento e , per cui questi diagrammi definiscono un'ampiezza proporzionale ad e^2 , e quindi ad α . La corrispondente probabilità è associata al modulo quadrato dell'ampiezza ed è quindi proporzionale ad e^4 , o equivalentemente ad α^2 .


Similmente lo scattering elettrone-positrone (Bhabha scattering) è descritto da



e lo scattering elettrone-fotone (Compton scattering) da



Anche lo scattering fotone-fotone è possibile: il primo termine perturbativo è dato da




insieme a grafici simili in cui le linee fotoniche esterne si attaccano ai vertici in ordine differente. Questo è un processo con ampiezza proporzionale ad α^2 (e probabilità proporzionale ad α^4). In generale le correzioni perturbative che corrispondono a grafici con dei “loop” possono essere divergenti: le divergenze devono poi essere curate con la rinormalizzazione. Nel caso dello scattering fotone-fotone il calcolo del grafico è finito (grazie alla struttura dettata dall’invarianza di gauge) e non c’è bisogno della rinormalizzazione.

In generale, nel modello standard il fotone si accoppia a tutte le particelle con carica elettrica. Il vertice fotone-elettrone presente in (33) si generalizza a tutti i fermioni del modello standard, ed assume la forma

$$\mathcal{L}_{int} = ieqA_\mu\bar{\psi}\gamma^\mu\psi \quad (34)$$


dove q è la carica elementare del campo ψ del fermione in esame, carica relativa a quella considerata unitaria del positrone (o del protone). In particolare, per elettrone, muone e tau si ha $q = -1$, per quarks up, charm e top si ha invece $q = \frac{2}{3}$, ed infine per quarks down, strange e bottom $q = -\frac{1}{3}$. Per i neutrini tale termine è assente (equivalentemente per loro vale $q = 0$).

Quindi per ogni fermione f del modello standard l’interazione elettromagnetica è descritta dal vertice elementare



dove $e > 0$ rappresenta la costante d’accoppiamento ($e \sim \sqrt{\alpha}$) e q il valore della carica della particella in termini della carica elementare e .

Oltre a questi fermioni, esiste un’altra particella del modello standard con carica elettrica, il bosone W^+ (e la corrispondente antiparticella W^-) mediatore delle interazioni deboli. A causa della sua carica elettrica, anche questa particella subisce interazioni elettromagnetiche. È una particella di spin 1, e gli accoppiamenti sono un po’ diversi da quelli dei fermioni. Sono infatti descritti dai seguenti due vertici elementari, un vertice cubico (3 particelle create o distrutte nel vertice) ed un vertice quartico (4 particelle create o distrutte nel vertice)



Si noti che il primo vertice porta una costante d'accoppiamento e , mentre il secondo vertice porta una costante d'accoppiamento e^2 .


Alcuni commenti fatti a lezione: i) $e \rightarrow e + \gamma$ non avviene, ii) rapporto R , iii) concetto di costante di accoppiamento running.

3.3 QCD: vertici elementari


La teoria delle interazioni forti (QCD, cromodinamica quantistica) fu modellata con successo proprio sulla struttura QED, sostituendo il gruppo di gauge abeliano $U(1)$, proprio della elettrodinamica quantistica, con il gruppo non abeliano $SU(3)$ associato al colore. Il colore rappresenta la carica non-abeliana che generalizza il concetto di carica elettrica (quest'ultima è detta carica abeliana perché associata ad un gruppo abeliano).

I quark possiedono 3 colori (convenzionalmente rosso, verde, blu) e tecnicamente si dice che si trasformano nella rappresentazione fondamentale (di dimensione 3) del gruppo $SU(3)$. Il gruppo $SU(3)$ definisce trasformazioni che ridefiniscono i colori e sono una simmetria della teoria. Si dice che i quark si trasformano nella 3. Gli antiquark possono avere 3 anticolori (antiroso, antiverde, antiblu) e si trasformano nella $\bar{3}$, la rappresentazione tridimensionale identificata dal complesso coniugato della rappresentazione fondamentale. Infine i gluoni, i mediatori della forza forte, possono avere 8 combinazioni di colori indipendenti, che si trasformano nella rappresentazione otto-dimensionale, la 8, sotto ridefinizioni del colore generate dal gruppo di simmetria $SU(3)$.


I quark colorati (con tre colori diversi) ed i corrispondenti antiquark (con i loro anticolori) sono descritti nella loro propagazione libera da equazioni d'onda relativistiche (eq. di Dirac), che generano il propagatore indicato come al solito da una linea orientata




così come i mediatori della forza forte, i cosiddetti gluoni, particelle senza massa e con spin $s = 1$, presenti in otto combinazioni colorate diverse, sono descritti dal propagatore indicato con




I vertici fondamentali della QCD descrivono l'interazione quark-quark-gluone (dove i quark sono dello stesso sapore, ma variano il colore in modo tale che, tenendo conto del colore del gluone, il colore totale sia conservato)



l'interazione a tre gluoni



e l'interazione a quattro gluoni



Naturalmente in ogni vertice ogni particella entrante può essere sostituita con una antiparticella uscente e viceversa. La costante d'accoppiamento delle interazioni forti è indicata con g_s . Si noti come nel vertice a 4 gluoni compaia un fattore g_s^2 . Tutte le interazioni forti sono dunque descritte dalla sola costante d'accoppiamento g_s .

3.4 Interazioni deboli


Anche le interazioni deboli sono basate su una teoria di gauge. Unite alle interazioni elettromagnetiche sono descritte dalla teoria elettrodebole: teoria di gauge basata sul gruppo $SU(2) \times U(1)$ con rottura spontanea della simmetria che avviene tramite l'interazione con il bosone di Higgs. Questa teoria fa correttamente emergere i mediatori della forza debole come particelle massive di spin 1 (i bosoni W^+ e W^- mediatori delle *interazioni deboli cariche*, ed il bosone Z_0 che media le *interazioni deboli neutre*) così da spiegare l'effettivo corto raggio d'azione di tali forze.

I vertici fondamentali che accoppiano i bosoni W^+ e W^- ai fermioni del modello standard possono essere descritti nel seguente modo. I fermioni del modello standard sono raggruppati

nei seguenti doppietti di isospin debole

$$\begin{pmatrix} \nu_e \\ e \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \nu_\mu \\ \mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \nu_\tau \\ \tau \end{pmatrix} ; \begin{pmatrix} u \\ d' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c \\ s' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ b' \end{pmatrix} .$$

In ciascun doppietto la particella posizionata in alto si può trasformare in quella corrispondente posizionata in basso con l'emissione di un W^+ , e similmente una particella posizionata in basso si può trasformare nella particella corrispondente posizionata in alto con l'emissione di un W^- . Naturalmente, in ciascun vertice ciascuna particella entrante (uscente) può essere sostituita dalla corrispondente antiparticella uscente (entrante). Con grafici di Feynman, prendendo ad esempio il primo doppietto $\begin{pmatrix} \nu_e \\ e \end{pmatrix}$, si ha




Nel settore dei quark, i bosoni W^\pm si accoppiano direttamente agli autostati di interazione debole (d', s', b') che sono collegati agli autostati di massa (d, s, b) da una matrice unitaria detta matrice CKM (Cabibbo-Kobayashi-Maskawa). Questa distinzione può essere ignorata per gli scopi di questa introduzione preliminare.

Per quanto riguarda le interazioni deboli neutre, ogni fermione del modello standard

$$\begin{pmatrix} \nu_e \\ e \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \nu_\mu \\ \mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \nu_\tau \\ \tau \end{pmatrix} ; \begin{pmatrix} u \\ d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c \\ s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ b \end{pmatrix}$$

può emettere un bosone Z_0 rimanendo una particella della stessa natura. Naturalmente in ciascun vertice ciascuna particella entrante (uscente) può essere sostituita dalla corrispondente antiparticella uscente (entrante), tenendo conto che l'antiparticella dello Z_0 coincide con lo Z_0 stesso. Con grafici di Feynman, indicando con f ogni singolo fermione si ha




Si noti quindi che le interazioni con lo Z_0 non cambiano il sapore del leptone con cui interagiscono (le particelle che emettono lo Z_0 rimangono particelle della stessa natura, con gli stessi numeri quantici di sapore). Anche le interazioni deboli hanno una loro costante d'accoppiamento

adimensionale, solitamente indicata con g , che risulta essere dello stesso ordine di grandezza delle costante d'accoppiamento elettromagnetica.


Per completezza, occorre menzionare che ci sono vertici di autointerazione anche tra i bosoni mediatori della forza elettrodebole: γ , W^\pm e Z_0 . In particolare esistono vertici cubici della forma γW^+W^- e $Z_0 W^+W^-$, e vertici quartici della forma $\gamma\gamma W^+W^-$, $Z_0 Z_0 W^+W^-$, $\gamma Z_0 W^+W^-$ e $W^+W^+W^-W^-$. La struttura di questi vertici è dettata dalla simmetria di gauge non-abeliana $SU(2) \times U(1)$.

3.5 Interazioni con il bosone di Higgs

Il meccanismo di Higgs, responsabile della rottura spontanea della simmetria di gauge $SU(2) \times U(1)$, congetturato per permettere una comprensione soddisfacente dell'esistenza delle masse elementari associate alle varie particelle del modello standard, prevede l'esistenza di una particella scalare neutra, detta bosone di Higgs. Con una certa semplificazione si può dire che fermioni del modello standard interagiscono con il bosone di Higgs tramite vertici cubici (detti vertici di Yukawa)




con una costante d'accoppiamento proporzionale alla massa del fermione. Il quark top, il fermione più massivo, è quindi quello che interagisce più fortemente con la particella di Higgs. Infatti, un esempio di processo studiato per la ricerca dell'Higgs è descritto dal seguente diagramma di Feynman



dove due gluoni creano coppie top-antitop con la successiva fusione di un top ed un antitop in un Higgs. Il bosone di Higgs e i quark top decadono poi in particelle più leggere, ad esempio

come nel seguente diagramma esteso



Anche le particelle massive di spin 1 (W^\pm e Z_0) interagiscono con il bosone di Higgs. Questo avviene tramite vertici cubici e quartici, e quindi anche le loro interazioni possono partecipare alla produzione di particelle di Higgs. Alcuni esempi sono riassunti nei diagrammi seguenti, che descrivono vari processi attualmente sotto studio per la produzione e rivelazione del bosone di Higgs:

